Réfection du pansement de l'émergence d'un cathéter de Dialyse en centre spécialisé (Hémodialyse en Centre, Unité de Dialyse Médicalisée)

V1 01-2025

Cette fiche est adaptée à la réalisation de 2 pansements distincts : le 1er pansement pour l'émergence et le 2ème pour les branches. La fiche concerne le pansement de l'émergence.

Le soin est réalisé en binôme par des professionnels formés. Le patient est installé en décubitus dorsal pour prévenir le risque d'embolie gazeuse.

Privilégier un pansement transparent semi-perméable stérile et le refaire tous les 7 jours .

En cas de pansement non transparent, la réfection est à réaliser à chaque séance. Si le pansement est décollé et/ou souillé, il est refait sans délai.

OPÉRATEUR	AIDE	PATIENT
Coiffe + masque chirurgical + lunettes de protection + Surblouse non stérile à UU manches longues	Coiffe + masque chirurgical + lunettes de protection + tenue propre (surblouse non stérile à UU manches longues si risque d'exposition importante)	Tenue propre (torse complètement dégagé) + masque chirurgical (si tête non recouverte par un champ stérile)

RETRAIT DU PANSEMENT

Retrait des gants

ANTISEPSIE

POSE DU PANSEMENT

Retrait des gants

BRANCHEMENT DÉBRANCHEMENT

. RÉALISER une friction hydro-alcoolique (FHA)
. ENFILER des gants non stériles
. RETIRER le pansement par étirement
. RETIRER les gants non stériles
. RÉALISER une FHA
. INSTALLER le matériel de façon aseptique sur un champ stérile sur une table préalablement désinfectée (aide)

. ENFILER des gants stériles
. **NETTOYER au savon doux stérile** (émergence puis branches)
. RINCER au sérum physiologique (monodose stérile)
. SÉCHER à l'aide de compresses stériles
. RÉALISER au moins 1 application d'un antiseptique alcoolique majeur (émergence puis branches). **Privilégier la Chlorhexidine 2% pour les réfections hebdomadaires**
. **RESPECTER le séchage spontané de l'antiseptique**

. POSER le pansement de l'émergence. **Privilégier un pansement transparent semi-perméable stérile**
. RETIRER les gants
. RÉALISER une FHA
. ENFILER des gants stériles
. RÉALISER le branchement et le débranchement avec l'aide, avec des compresses stériles imprégnées d'alcool à 70%

Bonnes pratiques d'hygiène en Hémodialyse - SF2H 2005 ; Bonnes pratiques et gestion des risques associés aux PICC - SF2H 12/2013 ; Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte - SF2H 05/2016. Fiche validée par le groupe technique Hémodialyse de la mission nationale SPIADI.